【がん種】 脳腫瘍
【レジメン名】 注射TMZ+RT
【登録番号】 290009
【1コースの期間】 10週間（TMZ終了後4週間休薬）
【投与間隔調整規定】 −2日
【総コース数】 術後・進行：1コースまで（終了後にPDでなければTMZを施行する）
【催吐性リスク】 中等度：テモダール
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：テモダール
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 白血球減少、好中球数減少、貧血、血小板数減少、疲労、間質性肺炎、悪心、嘔吐、食欲不振、口腔粘膜炎、味覚不全、下痢、便秘、脱毛

【必要な検査】 一般採血
【根拠論文】 N Engl J Med 352:987-996, 2005. Lancet Oncol 10:459-466, 2009. N Engl J Med 370:709-722, 2014.

【点滴の時間】 [day1～42]4時間10分
【その他】 放射線照射の中断により放射線治療期間が延長した場合には最大day49までテモダール投与可能. リンパ球数減少が出現した場合にはGrade1以下に改善するまでバクトラミン注あるいはバクタ配合錠を継続する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日					…					…					…					…					…					…					…		…	
					1	2	3	4	5		8	9	10	11	12		15	16	17	18	19		22	23	24	25	26		29	30	31	32	33		36	37	38	39	40		42		70
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	生理食塩液 100mL バクトラミン注 5mL 1 A 調製開始から2時間以内に投与終了	1 B	側管	1時間	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
3	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
4	グラニセトロン点滴静注液バッグ 3mg/100mL	1 B	側管	30分	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
5	生理食塩液 50mL	1 B	側管	全開	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
6	生理食塩液 250mL テモダール点滴静注用 75 mg/m2 蒸留水 100mL 1 B テモダール溶解用 調製開始から14時間以内に投与終了	1 B	側管	90分	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				