

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
 【レジメン名】 Bendamustine
 【登録番号】 011118
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 6コースまで
 【催吐性リスク】 中等度:トレアキシ
 【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(壊死性):トレアキシ
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 J Clin Oncol 26:204-210, 2008. Cancer Sci 101:2059-2064, 2010. J Clin Pharmacol 57:1400-1408, 2017. 2018001試験.

【点滴の時間】 [day1, 2]1時間40分
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者: 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫あるいはマントル細胞リンパ腫.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日			
					1	2	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○		
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○			
3	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 A 1 V	側管	30分		○		
4	生理食塩液 50mL トレアキシ点滴静注用 調製後6時間以内に投与を終了する	1 B 120 mg/m2	側管	10分	○	○		