【がん種】 非ホジキンリンパ腫
【レジメン名】 Pralatrexate
【登録番号】 011142
【1コースの期間】 7週間
【総コース数】 PDまで
【催吐性リスク】 軽度：ジフォルタ
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：ジフォルタ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 29:1182-1189, 2011. Cancer Sci 108:2061-2068, 2017.

【点滴の時間】 [day1, 8, 15, 22, 29, 36]1時間35分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者：末梢性T細リンパ腫. ジフォルタ：限定使用薬品.
氷の準備：患者が売店で購入する, 外来化学療法の場合は化学療法室の冷凍庫で作成可能.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…	49
1	調剤用 パンビタン末 ジフォルタ初回投与の10日以上前から開始し、最終投与日から31日目まで連日服用する	2 g/回	内服	1日1回朝食後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	ビタミンB12注 1000μg/1mL ジフォルタ初回投与の10日以上前に投与し、投与期間中は8～10週間毎に投与する	1 A	筋注		8～10週間毎												
3	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○		○		○		○		○		○		
4	氷を口の中に含み口腔内を冷却 ジフォルタ投与開始5分前～投与終了30分後まで				○		○		○		○		○		○		
5	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○		○		○		○		○		○		
6	生理食塩液 50mL ジフォルタ注射液	1 B 30 mg/m2	側管	3～5分	○		○		○		○		○		○		