

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
 【レジメン名】 mLSG15②AMP
 【登録番号】 011145
 【1コースの期間】 1週間
 【総コース数】 6コースまで(mLSG15①→mLSG15②→mLSG15③を1セットとして6セットまで。mLSG15④髄注は、1, 3, 5セット目のmLSG15③day13～14の間で実施。アドリアシン生涯投与量500mg/m2まで)
 【催吐性リスク】 中等度:アドリアシン、軽度:サイメリン
 【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):アドリアシン、サイメリン
 【投与量に制限のある薬剤】 アドリアシン:生涯に500mg/m2まで
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 J Clin Oncol 25:5458-5464, 2007.

【点滴の時間】 [day1]2時間10分
 【費用】 編集中
 【その他】 サイメリン:限定使用薬品.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	7
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg 水溶性プレドニン 50mg	1 B 1 A 40 mg/m2	側管	30分	○		
4	生理食塩液 100mL アドリアシン注用	1 B 30 mg/m2	側管	全開	○		
5	5%ブドウ糖液 100mL 注射用サイメリン 調製開始から2時間以内に投与終了	1 B 60 mg/m2	側管	30分 遮光	○		