

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
【レジメン名】 mLSG15③/VECP
【登録番号】 011146
【1コースの期間】 2週間
【総コース数】 6コースまで(mLSG15①→mLSG15②→mLSG15③を1セットとして6セットまで。mLSG15④髄注は、1, 3, 5セット目のmLSG15③day13～14の間で実施。アドリアシン生涯投与量500mg/m2まで)
【催吐性リスク】 中等度:カルボプラチン、軽度:ラステット、最小度:フィルデシン
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):フィルデシン(漏出時の冷却禁止、漏出時のステロイド局注禁止)、イリタント(炎症性):ラステット、カルボプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 25:5458-5464, 2007.

【点滴の時間】 [day1]4時間5分、[day2, 3]3時間
【費用】 編集中
【その他】 フィルデシン: 限定使用薬品.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	14
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○		
2	生理食塩液 100mL アロキシン静注 0.75mg 水溶性プレドニン 50mg	1 B 1 A 40 mg/m2	側管	30分	○				
3	生理食塩液 100mL 水溶性プレドニン 50mg	1 B 40 mg/m2	側管	30分		○	○		
4	生理食塩液 50mL 注射用フィルデシン	1 B 2.4 mg/m2	側管	全開	○				
5	5%ブドウ糖液 500mL ラステット注 調製開始から3時間以内に投与終了	1 B 100 mg/m2	側管	90分	○	○	○		
6	5%ブドウ糖液 250mL カルボプラチン点滴静注液「NK」	1 B 250 mg/m2	側管	1時間	○				