

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
【レジメン名】 mLSG15+Mogamulizumab②AMP
【登録番号】 011150
【1コースの期間】 6日間
【総コース数】 4コースまで(mLSG15+Mogamulizumab①→②→③を1セットとして4セットまで。④髄注は、1, 3セット目のmLSG15+Mogamulizumab③day14～15の間で実施。アドリアシン生涯投与量500mg/m2まで。)
【催吐性リスク】 中等度:アドリアシン、軽度:サイメリン
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):アドリアシン、サイメリン
【投与量に制限のある薬剤】 アドリアシン:生涯に500mg/m2まで
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 British Journal of Haematology 169:672-682, 2015.

【点滴の時間】 [day1]2時間10分
【費用】 編集中
【その他】 サイメリン:限定使用薬品.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	6
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg 水溶性プレドニン 50mg	1 B 1 A 40 mg/m2	側管	30分	○		
4	生理食塩液 100mL アドリアシン注用	1 B 30 mg/m2	側管	全開	○		
5	5%ブドウ糖液 100mL 注射用サイメリン 調製開始から2時間以内に投与終了	1 B 60 mg/m2	側管	30分 遮光	○		