

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
 【レジメン名】 Mogmulizumab②2週毎
 【登録番号】 011141
 【1コースの期間】 2週間
 【総コース数】 PDまで(Mogmulizumab②1週毎終了後から)
 【催吐性リスク】 軽度:ポテリジオ
 【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):ポテリジオ
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 Lancet Oncol 19:1192-1204, 2018.

【点滴の時間】 [day1]3時間35分
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者:皮膚T細胞性リンパ腫.
 ポテリジオ:限定使用薬品.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	14
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	アセトアミノフェン錠 200mg	3 錠/回	内服	1日1回 ポテリジオ投与30分前	○		
3	生理食塩液 50mL ソル・コーテフ注射用 100mg ポラミン注 5mg/1mL	1 B 1 V 1 A	側管	全開 開始時にアセトアミノフェン内服	○		
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		
5	生理食塩液 250mL ポテリジオ点滴静注	1 B 1 mg/kg	側管	2時間	○		