

**【がん種】** [非ホジキンリンパ腫](#)  
**【レジメン名】** 2-CdA  
**【登録番号】** 011107  
**【1コースの期間】** 4週間  
**【総コース数】** 6コースまで  
**【催吐性リスク】** 最小度:ロイスタチン  
**【抗がん剤の組織障害性】** ノンビシカント(起壊死性):ロイスタチン  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** Leukemia and Lymphoma 26:99-105, 1997. Br J Haematol 103:690-695, 1998. Cancer Sci 100:1344-1350, 2009.

**【点滴の時間】** [day1, 2, 3, 4, 5]3時間  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象患者:低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫あるいは濾胞性リンパ腫あるいはマントル細胞リンパ腫.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	2	3	4	5	...	28	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○	○	○			
2	生理食塩液 100mL ロイスタチン注	1 B 0.12 mg/kg	側管	2時間	○	○	○	○	○			