

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
 【レジメン名】 FC
 【登録番号】 011111
 【1コースの期間】 4週間
 【総コース数】 4コースまで
 【催吐性リスク】 中等度:エンドキサン、最小度:フルダラ
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):エンドキサン、ノンシカント(非壊死性):フルダラ
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 Uukemia & Lymphoma 44:993-996, 2003. Cancer 100:2181-2189, 2004.

【点滴の時間】 [day1, 2, 3]2時間30分
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者:低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫あるいは濾胞性リンパ腫あるいはマントル細胞リンパ腫.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○		
2	生理食塩液 100mL アロキシン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○				
2	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 A 1 V	側管	30分		○	○		
3	生理食塩液 100mL フルダラ静注用 蒸留水 100mL	1 B 25 mg/m2 1 B	側管	30分 フルダラ溶解用	○	○	○		
4	生理食塩液 100mL 注射用エンドキサン	1 B 250 mg/m2	側管	30分	○	○	○		