【がん種】 非ホジキンリンパ腫
【レジメン名】 FLU
【登録番号】 011110
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 10コースまで
【催吐性リスク】 最小度:フルダラ
【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):フルダラ
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 10:790-794, 1992. J Clin Oncol 17:546-553, 1999. J Clin Oncol 20:4649-4654, 2002. J Clin Oncol 24:1590-1596, 2006.

【点滴の時間】 [day1, 2, 3, 4, 5]1時間30分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫あるいは濾胞性リンパ腫あるいはマントル細胞リンパ腫.
フルダラ:前コースにおいて高度の骨髄抑制が認められなかった場合に限り最大25mg/m2/日まで増量可能.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	4	5	…	28
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○	○	○	○		
2	生理食塩液 100mL フルダラ静注用 蒸留水 100mL	1 B 20 mg/m2 1 B	側管	30分 フルダラ溶解用	○	○	○	○	○		