

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
 【レジメン名】 GCD
 【登録番号】 011124
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 4コースまで
 【催吐性リスク】 中等度:カルボプラチン、軽度:ゲムシタピン
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ゲムシタピン、カルボプラチン
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 Leukemia & Lymphoma 51:1523-1529, 2010.

【点滴の時間】 [day1]3時間、[day8]2時間
 【費用】 編集中
 【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日												
					1	2	3	4	...	8	...	21					
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○												
2	グラニセトロン点滴静注液/バッグ 3mg/100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 5 V	側管	30分	○												
3	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1000 mg/m2	側管	30分	○												
4	5%ブドウ糖液 250mL カルボプラチン点滴静注液「NK」	1 B AUC5	側管	1時間	○												
5	デカドロン錠 4mg	10 錠/回	内服	1日1回朝食後		○	○	○									
6	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ											○		
7	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分											○		
8	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1000 mg/m2	側管	30分											○		