

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
 【レジメン名】 Rメンテナンス
 【登録番号】 011120
 【1コースの期間】 8週間
 【総コース数】 12コースまで
 【催吐性リスク】 最小度:リツキシマブBS
 【抗がん剤の組織障害性】 ノンビシカント(非壊死性):リツキシマブBS
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 Lancet 377:42-51, 2010. Int J Hematol 104:700-708, 2016.

【点滴の時間】 [day1]初回約5時間, 2回目～約4時間
 【費用】 編集中
 【その他】 対象患者: CD20+の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	56
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	アセトアミノフェン錠 200mg	3 錠/回	内服	1日1回 リツキシマブBS投与30分前	○		
3	生理食塩液 50mL ソル・コーテフ注射用 100mg ポラミン注 5mg/1mL	1 B 1 V 1 A	側管	全開 開始時にアセトアミノフェン内服	○		
4	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○		
5	生理食塩液 500mL リツキシマブBS点滴静注「KHK」	- mL 375 mg/m ²	側管	1mg/mLの濃度に調製 初回 50mL/hで開始し、30分毎に50mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで 2回目～ 100mL/hで開始し、30分毎に100mL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで	○		