

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
【レジメン名】 THP-COP
【登録番号】 011106
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 6コースまで(テラルピシン生涯投与量950mg/m2まで)
【催吐性リスク】 中等度:テラルピシン, エンドキサン, 最小度:オンコピン
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):オンコピン(漏出時の冷却禁止, 漏出時のステロイド局注禁止), テラルピシン, イリタント(炎症性):エンドキサン
【投与量に制限のある薬剤】 オンコピン:1回に2mg/bodyまで、テラルピシン:生涯に950mg/m2まで
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Int J Hematol 81:246-254, 2005. Hematol Oncol 25:107-114, 2007. Eur J Haematol 84:391-397, 2010.

【点滴の時間】 [day1]2時間45分
【費用】 編集中
【その他】 テラルピシン:調製後6時間以内に投与を終了する. エンドキサン:調製後6時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	4	5	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	グラニセトロン点滴静注液/バッグ 3mg/100mL 水溶性プレドニン 10mg	1 B 3 A	側管	30分	○								
3	生理食塩液 50mL オンコピン注射用	1 B 1 mg/m2	側管	全開	○								
4	生理食塩液 100mL テラルピシン注射用	1 B 30 mg/m2	側管	全開 フィルター使用	○								
5	生理食塩液 250mL 注射用エンドキサン	1 B 500 mg/m2	側管	1時間	○								
6	プレドニン錠 5mg	6 錠/回	内服	1日1回朝食後		○	○	○	○				