

**【がん種】** [非ホジキンリンパ腫](#)  
**【レジメン名】** CHOP  
**【登録番号】** 011101  
**【1コースの期間】** 3週間  
**【総コース数】** 8コースまで(アドリアシン生涯投与量500mg/m2まで)  
**【催吐性リスク】** 高度:CHOP  
**【抗がん剤の組織障害性】** ビシカント(起壊死性):オンコビン(漏出時の冷却禁止, 漏出時のステロイド局注禁止), アドリアシン, イリタント(炎症性):エンドキサン  
**【投与量に制限のある薬剤】** オンコビン:1回に2mg/bodyまで、アドリアシン:生涯に500mg/m2まで  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** N Engl J Med 328:1002-1006, 1993.

**【点滴の時間】** [day1]2時間45分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** エンドキサン:調製後6時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	4	5	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	グラニセトロン点滴静注液/バッグ 3mg/100mL 水溶性プレドニン 50mg	1 B 2 A	側管	30分	○								
3	生理食塩液 50mL オンコビン注射用	1 B 1.4 mg/m2	側管	全開	○								
4	生理食塩液 100mL アドリアシン注用	1 B 50 mg/m2	側管	全開	○								
5	生理食塩液 250mL 注射用エンドキサン	1 B 750 mg/m2	側管	1時間	○								
6	プレドニン錠 5mg	20 錠/回	内服	1日1回朝食後		○	○	○	○				