

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
【レジメン名】 CVP
【登録番号】 011112
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 8コースまで
【催吐性リスク】 中等度:エンドキサン、最小度:オンコビン
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):オンコビン(漏出時の冷却禁止, 漏出時のステロイド局注禁止)、イリタント(炎症性):エンドキサン
【投与量に制限のある薬剤】 オンコビン:1回に2mg/bodyまで
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 20:4649-4654, 2002 Blood 105:1417-1423, 2005. J Clin Oncol 24:1590-1596, 2006. J Clin Oncol 26:4579-4586, 2008.

【点滴の時間】 [day1]2時間35分
【費用】 編集中
【その他】 エンドキサン:調製後6時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	4	5	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	グラニセトロン点滴静注液/バッグ 3mg/100mL 水溶性プレドニン 50mg	1 B 2 A	側管	30分	○								
3	生理食塩液 50mL オンコビン注射用	1 B 1.4 mg/m2	側管	全開	○								
4	生理食塩液 250mL 注射用エンドキサン	1 B 750 mg/m2	側管	1時間	○								
5	プレドニン錠 5mg	20 錠/回	内服	1日1回朝食後		○	○	○	○				