【がん種】 非小細胞肺癌
【レジメン名】 CDDP+DTX+RT
【登録番号】 100224
【1コースの期間】 8週間
【総コース数】 根治的：1コースまで
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン、軽度：ドセタキセル
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント（起壊死性）：ドセタキセル、イリタント（炎症性）：シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 28:3299-3306, 2010.

【点滴の時間】 [day1, 8, 29, 36]9時間
【費用】 編集中
【その他】 ドセタキセル：調製後4時間以内に投与を終了する,

| Rp | 薬剤名 | 量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | … | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | … | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | … | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | … | 56 |
| 1 | 生理食塩液 250mL | 1 B | メイン | キープ＆フラッシュ | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| 2 | ソルデム3A 500mL | 1 B | 側管 | 90分 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| | 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL | 0.4 A | | AM8:00～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ソルデム1 500mL | 1 B | 側管 | 90分 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 100mL | 1 B | 側管 | 30分 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| | アロキシ静注 0.75mg | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL | 2 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デカドロン注射液 6.6mg/2mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 250mL | 1 B | 側管 | 1時間 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| | ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」 | 40 mg/m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生理食塩液 100mL | 1 B | 側管 | 15分 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| 7 | 生理食塩液 100mL | 1 V | 側管 | 15分 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| | ラシックス注 20mg/2mL | 1 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 生理食塩液 250mL | 1 B | 側管 | 90分 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| | シスプラチン点滴静注「マルコ」 | 40 mg/m2 | | 遮光 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ソルデム3A 500mL | 1 B | メイン | 90分 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| 10 | 放射線 | 2 Gy/回 | | 1日1回抗がん剤投与終了後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 11 | デカドロン錠 4mg | 1 錠/回 | 内服 | 1日2回朝昼食後 | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | |