【がん種】 非小細胞肺癌
【レジメン名】 CDDP+GEM
【登録番号】 100214
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発：4～6コースまで
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン、軽度：ゲムシタビン
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント（炎症性）：ゲムシタビン, シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Ann Oncol 18:317-323, 2007. J Clin Oncol 26:3543-3551, 2008. J Clin Oncol 27:1227-1234, 2009.

【点滴の時間】 [day1～]73時間、[day8]2時間
【費用】 編集中
【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	2	3	4	…	8	…	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○							
2	ソルデム3A 500mL	1 B	側管	90分	○							
	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	0.4 A		AM8:00～								
3	ソルデム1 500mL	1 B	側管	90分	○							
4	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分	○							
	プロイメンド点滴静注用 150mg	1 V										
5	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○							
	アロキシ静注 0.75mg	1 V										
	デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL	2 A										
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V										
6	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分	○							
	ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」	1000 mg/m2										
7	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○							
8	生理食塩液 100mL	1 V	側管	15分	○							
	ラシックス注 20mg/2mL	1 A										
9	生理食塩液 250mL	1 B	側管	90分	○							
	シスプラチン点滴静注「マルコ」	80 mg/m2		遮光								
10	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	90分	○							
11	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	9時間　残破棄	○							
12	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○	○				
				AM0:00～								
13	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分		○						
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V		AM6:00～								
14	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分			○	○				
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	2 V		AM6:00～								
15	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○					
16	ラクテック注 500mL	1 B	メイン	8時間		○	○					
17	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ						○		
18	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分						○		
	デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 V										
19	生理食塩液 100mL	1 B	側管	30分						○		
	ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」	1000 mg/m2										