【がん種】 非小細胞肺癌
【レジメン名】 CDDP+VNR ショートハイドレーション
【登録番号】 100228
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発：4～6コースまで
【催吐性リスク】 高度：シスプラチン、最小度：ロゼウス
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント（起壊死性）：ロゼウス（漏出時の冷却禁止, 漏出時のステロイド局注禁止）、イリタント（炎症性）：シスプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Ann Oncol 18:317-323, 2007. J Thorac Dis 4:562-568, 2012. Jpn J Clin Oncol 43:1105-1109, 2013.
シスプラチン投与におけるショートハイドレーション法の手引き：2015年. がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016.
【点滴の時間】 [day1]6時間55分、[day8]1時間40分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者：Ccr60mL/min以上, 飲水指示に対して十分な理解力がある, 心機能が保たれている（1時間あたり500mLの補液に耐えうる）, ECOG PS 0～1. 飲水は少量ずつ行う.
ロゼウス：必要に応じてポートからの投与を考慮する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	2	3	4	…	8	…	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ	○							
2	飲水	約1 L	経口	シスプラチン投与終了までに	○							
3	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1 B 0.4 A	側管	1時間 AM9:00～	○							
4	ソルデム1 500mL	1 B	側管	1時間	○							
5	生理食塩液 250mL プロイメンド点滴静注用 150mg	1 B 1 V	側管	30分	○							
6	生理食塩液 100mL アロキシ静注 0.75mg	1 B 1 V	側管	30分	○							
7	生理食塩液 50mL ロゼウス静注液	1 B 25 mg/m2	側管	全開	○							
8	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 2 A 1 V	側管	全開	○							
9	生理食塩液 100mL	1 B	側管	15分	○							
10	20%マンニットール注射液 300mL	0.5 V	側管	30分	○							
11	生理食塩液 250mL シスプラチン点滴静注「マルコ」	1 B 80 mg/m2	側管	1時間 遮光	○							
12	ソルデム3A 500mL	1 B	メイン	1時間	○							
13	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝昼食後		○						
14	デカドロン錠 4mg	2 錠/回	内服	1日2回朝昼食後			○	○				
15	飲水	最低1 L	経口	1日かけて飲水		○	○					
16	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ＆フラッシュ						○		
17	生理食塩液 50mL ロゼウス静注液	1 B 25 mg/m2	側管	全開						○		
18	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	全開						○		
19	生理食塩液 250mL	1 B	側管	30分						○		