

【がん種】 [非小細胞肺癌](#)
 【レジメン名】 GEM
 【登録番号】 100213
 【1コースの期間】 4週間
 【総コース数】 進行・再発:PDまで
 【催吐性リスク】 軽度:ゲムシタピン
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ゲムシタピン
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 J Natl Cancer Inst 91:66-72, 1999. Br J Cancer 83:447-453, 2000. J Natl Cancer Inst 95:362-372, 2003. Lancet 378:1079-1088, 2011.

【点滴の時間】 [day1, 8, 15]2時間
 【費用】 編集中
 【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日							
					1	...	8	...	15	...	28	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		○		○			
2	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○		○		○			
3	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1000 mg/m2	側管	30分	○		○		○			