

【がん種】 [非小細胞肺癌](#)
【レジメン名】 Nedaplatin+DTX
【登録番号】 100239
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 進行・再発:4~6コースまで
【催吐性リスク】 中等度:ネダプラチン、軽度:ドセタキセル
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(壊死性):ドセタキセル、イリタント(炎症性):ネダプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 Lancet Oncol 16:1630-1638, 2015.

【点滴の時間】 [day1]7時間
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:扁平上皮癌.ドセタキセル:調製後4時間以内に投与を終了する.アクブラ:調製後6時間以内に投与を終了する.

| Rp | 薬剤名 | 量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | |
|----|--|-------------------|------|-----------|-----|---|---|-----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 21 |
| 1 | 生理食塩液 250mL | 1 B | メイン | キープ&フラッシュ | ○ | | | | |
| 2 | グラニセトロン点滴静注液バッグ 3mg/100mL デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL | 1 B 2 A 1 V | 側管 | 30分 | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 250mL ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」 | 1 B 60 mg/m2 | 側管 | 1時間 | ○ | | | | |
| 4 | 生理食塩液 500mL アクブラ静注用 | 1 B 100 mg/m2 | 側管 | 90分 | ○ | | | | |
| 5 | ソルデム3A 500mL | 1 B | 側管 | 90分 | | | | | |
| 6 | ラクテック注 500mL | 1 B | 側管 | 90分 | | | | | |
| 7 | デカドロン錠 4mg | 1 錠/回 | 内服 | 1日2回朝食後 | ○ | ○ | | | |