

【がん種】 [卵巣癌](#)
【レジメン名】 PLD
【登録番号】 252307
【1コースの期間】 4週間
【総コース数】 進行・再発:PDまで(ドキシル生涯投与量500mg/m2まで)
【催吐性リスク】 軽度:ドキシル
【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ドキシル
【投与量に制限のある薬剤】 ドキシル:生涯に500mg/m2まで
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 19:3312-3322, 2001. Gynecologic Oncology 95:1-958, 2004. J Clin Oncol 25:2811-2818, 2007. J Clin Oncol 26:890-896, 2008.

【点滴の時間】 [day1]約2時間45分程度
【費用】 編集中
【その他】 ドキシル:使用直前に調製(2~8°C保存で24時間以内に投与終了, 投与の1時間前に冷蔵庫から取り出し室温に戻してから使用する). 90mg以上の場合は5%ブドウ糖500mLに希釈する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日		
					1	...	28
1	5%ブドウ糖液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○		
2	5%ブドウ糖液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分	○		
3	5%ブドウ糖液 250mL ドキシル注	1 B 50 mg/m2	側管	1mg/分 フィルター使用禁止	○		