

【がん種】 [卵巣癌](#)
【レジメン名】 TC
【登録番号】 252301
【1コースの期間】 3週間
【総コース数】 術後:6コースまで、進行・再発:連続6コースまで
【催吐性リスク】 中等度:カルボプラチン、軽度:パクリタキセル
【抗がん剤の組織障害性】 ビシカント(起壊死性):パクリタキセル、イリタント(炎症性):カルボプラチン
【投与量に制限のある薬剤】 なし
【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
【根拠論文】 J Clin Oncol 21:3194-3200, 2003. J Natl Cancer Inst 95:1320-1330, 2003. J Natl Cancer Inst 96:1682-1691, 2009. Lancet 374:1331-1338, 2009. J Clin Oncol 28:3323-3329, 2010. N Engl J Med 365:2473-2483, 2011. N Engl J Med 365:2484-2496, 2011. Br J Cancer 107:588-591, 2012. Lancet Oncol 14:1020-1026, 2013. Ann Oncol 25:251-257, 2014. Lancet. 361:2099-2106, 2003.

【点滴の時間】 [day1]5時間35分
【費用】 編集中
【その他】 対象患者:アルコール不耐性ではない。
 パクリタキセル:自然落下投与時は本来の滴数の約1.5倍に設定する。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日					
					1	2	3	...	21	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○					
2	レスタミン錠 10mg	5 錠/回	内服	1日1回 パクリタキセル投与30分前	○					
3	生理食塩液 50mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注射用 20mg	1 B 3 V 1 A	側管	全開 開始時にレスタミン内服	○					
4	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg	1 B 1 V	側管	30分	○					
5	生理食塩液 500mL パクリタキセル注「NK」	1 B 180 mg/m2	側管	3時間 フィルター使用(DEHPフリー)	○					
6	5%ブドウ糖液 250mL カルボプラチン点滴静注液「NK」	1 B AUC6	側管	1時間	○					
7	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○	○			