

【がん種】 [卵巣癌](#)
 【レジメン名】 CBDCA+GEM
 【登録番号】 252316
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 進行・再発:連続6~10コースまで
 【催吐性リスク】 中等度:カルボプラチン、軽度:ゲムシタピン
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ゲムシタピン, カルボプラチン
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 J Clin Oncol 24:4699-4707, 2006. J Clin Oncol 30:2039-2045, 2012.

【点滴の時間】 [day1]3時間、[day8]2時間
 【費用】 編集中
 【その他】 -

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	...	8	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	生理食塩液 100mL アロキシン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○								
3	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1000 mg/m2	側管	30分	○								
4	5%ブドウ糖液 250mL カルボプラチン点滴静注液「NK」	1 B AUC4	側管	1時間	○								
5	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後	○	○							
6	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ						○			
7	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分						○			
8	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1000 mg/m2	側管	30分						○			