

**【がん種】** [卵巣癌](#)  
**【レジメン名】** CBDCA+GEM+Bmab  
**【登録番号】** 252318  
**【1コースの期間】** 3週間  
**【総コース数】** 進行・再発:6~10コースまで(終了後にPDでなければBmabメンテナンスを施行する)  
**【催吐性リスク】** 中等度:カルボプラチン、軽度:ゲムシタピン、最小度:アバスチン  
**【抗がん剤の組織障害性】** イリタント(炎症性):ゲムシタピン、カルボプラチン、ノンビシカント(非壊死性):アバスチン  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** J Clin Oncol 30:2039-2045, 2012.

**【点滴の時間】** [day1]初回4時間30分, 2回目4時間, 3回目~3時間30分、[day8]2時間  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象患者:大きな手術後から28日以上経過している, 2.5mL以上の鮮血の喀血がない.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日								
					1	2	3	...	8	...	21		
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○								
2	生理食塩液 100mL アロキシン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○								
3	生理食塩液 100mL アバスチン点滴静注用 初回90分、2回目1時間、3回目~30分	1 B 15 mg/kg	側管		○								
4	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1000 mg/m2	側管	30分	○								
5	5%ブドウ糖液 250mL カルボプラチン点滴静注液「NK」	1 B AUC4	側管	1時間	○								
6	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後		○	○						
7	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ						○			
8	生理食塩液 100mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V	側管	30分						○			
9	生理食塩液 100mL ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」	1 B 1000 mg/m2	側管	30分						○			