

**【がん種】** [卵巣癌](#)  
**【レジメン名】** DC  
**【登録番号】** 252317  
**【1コースの期間】** 3週間  
**【総コース数】** 術後:6コースまで、進行:6コースまで  
**【催吐性リスク】** 中等度:カルボプラチン、軽度:ドセタキセル  
**【抗がん剤の組織障害性】** ビシカント(起壊死性):ドセタキセル、イリタント(炎症性):カルボプラチン  
**【投与量に制限のある薬剤】** なし  
**【主な有害事象】** 編集中

**【必要な検査】** 編集中  
**【根拠論文】** J Natl Cancer Inst 96:1682-1691, 2009. Int J Clin Oncol 12:205-211, 2007.

**【点滴の時間】** [day1]3時間30分  
**【費用】** 編集中  
**【その他】** 対象患者: 初回化学療法例, ドセタキセル: 調製後4時間以内に投与を終了する.

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日				
					1	2	3	...	21
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○				
2	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカドロン注射液 1.65mg/0.5mL デカドロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 2 A 1 V	側管	30分	○				
3	生理食塩液 250mL ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」	1 B 75 mg/m2	側管	1時間	○				
4	5%ブドウ糖液 250mL カルボプラチン点滴静注「NK」	1 B AUC5	側管	1時間	○				
5	デカドロン錠 4mg	1 錠/回	内服	1日2回朝食後	○	○			