

【がん種】 [非ホジキンリンパ腫](#)
 【レジメン名】 CHASE
 【登録番号】 011108
 【1コースの期間】 3週間
 【総コース数】 5コースまで
 【催吐性リスク】 中等度:エンドキサン, シタラビン、軽度:ラステット
 【抗がん剤の組織障害性】 イリタント(炎症性):ラステット(漏出時の冷却禁止), エンドキサン、ノンビシカント(非壊死性):シタラビン
 【投与量に制限のある薬剤】 なし
 【主な有害事象】 編集中

【必要な検査】 編集中
 【根拠論文】 Int J Hematol 77:503-511, 2003.

【点滴の時間】 [day1~]35時間、[day3]6時間
 【費用】 編集中
 【その他】 ラステット:調製後3時間以内に投与を終了する。エンドキサン:調製後6時間以内に投与を終了する。

Rp	薬剤名	量	投与方法	投与時間	投与日						
					1	2	3	4	...	21	
1	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○						
2	ソルデム1 500mL メイロン静注7% 20mL	1 B 1 A	側管	5時間 AM6:00~	○						
3	生理食塩液 100mL アロキン静注 0.75mg デカロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 1 V 5 V	側管	30分	○						
4	5%ブドウ糖液 500mL ラステット注	1 B 100 mg/m2	側管	90分	○						
5	生理食塩液 500mL 注射用エンドキサン	1 B 1200 mg/m2	側管	2時間	○						
6	ソルデム1 500mL メイロン静注7% 20mL	1 B 1 A	メイン	6時間	○						
7	ソルデム1 500mL メイロン静注7% 20mL	1 B 1 A	メイン	6時間 残破棄	○						
8	ソルデム1 500mL メイロン静注7% 20mL	1 B 1 A	メイン	6時間 AM0:00~		○					
9	ソルデム1 500mL メイロン静注7% 20mL	1 B 1 A	メイン	6時間 残破棄		○					
10	生理食塩液 250mL	1 B	メイン	キープ&フラッシュ	○	○					
11	生理食塩液 100mL デカロン注射液 6.6mg/2mL	1 B 5 V	側管	30分		○	○				
12	5%ブドウ糖液 500mL ラステット注	1 B 100 mg/m2	側管	90分		○	○				
13	生理食塩液 250mL シタラビン点滴静注液「テ/バ」	1 B 2000 mg/m2	側管	3時間		○	○				
14	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% シタラビン投与日の朝から投与終了翌日の夜まで	1 本	外用	1日4回両眼		○	○	○			